

FERTIGOFOL ULTRA


Agro nutrition

NAWÓZ

Technologia precyzyjna

N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	SO ₃	CaO
100	36	85	1,3	1	
B	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn
0,5	0,14	0,25	0,5	0,05	0,4


ABN

W g/l dla produktów płynnych

Opis produktu

OPAKOWANIE

10 L

OKRES WAŻNOŚCI

36 miesięcy

FORMA

Płyn (SL)

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

FORMULACJA

Aktywne Odżywanie Komórkowe & Kompleks Aminokwasów

APLIKACJA

Dolistna

Korzyści agronomiczne

Technologia Agronutrition

Technologia Agronutrition "Aktywne Odżywanie Komórkowe & Kompleks Aminokwasów"

1 Aktywne Odżywanie Komórkowe: unikalny kompleks istotnych składników odżywczych / Zachowanie naturalnej równowagi sap oraz zrównoważenie odżywienia rośliny / Tworzenie okresowego bardzo wysokiego stężenia składników pokarmowych pomagającego roślinie wrócić do stanu równowagi / Wzrost pobierania przez korzenie.

2- Kompleks Aminokwasów
Bardzo istotny jest odpowiednio skomponowany skład aminokwasów w roślinie, tak aby uzyskać jak najszersze spektrum aktywności komórkowej. Aminokwasy odgrywają kluczową rolę w wielu procesach fizjologicznych.

KLUCZOWE ZALETY

FERTIGOFOL Ultra poprawia poziom odżywienia roślin. Stosowany w formie dolistnej, aktywuje metabolizm każdej komórki roślinnej. W całej roślinie powoduje to usprawnienie procesu fotosyntezy oraz zwiększa poziom pobieranych przez system korzeniowy składników pokarmowych.

FERTIGOFOL Ultra jest wielowartościowym produktem, który może być stosowany w wielu uprawach.

FERTIGOFOL Ultra zwiększa:
Metabolizm Azotu / Energii/ Fotosyntezę/ Rozwój wegetatywny /Dojrzwienie / Regulację stresu osmotycznego i wodnego / Kiełkowanie nasion / Rozwój korzeni / Kwitnienie / Parametry jakościowe plonu

FORMULACJA - ZALETY

> Aktywne Odżywanie Komórkowe:

- 1- Efekt stymulacji dolistnej
- 2- Wysokowartościowe odżywanie poprzez liście
- 3- Właściwości adjuwantowe: wzrost efektywności zabiegu dolistnego

> Aminokwasy charakteryzuje złożony, naturalny efekt:

Efekt kompleksujący jest wynikiem połączenia dwóch aminokwasów z atomem metalu (Fe, Cu, Mn, Zn). Aminokwasy zwiększają absorpcję jonów metalu powodując przepuszczalność membrany komórkowej. Poziom absorpcji przez liście jest znacznie wyższy.

Stosowanie

DAWKI I TERMINY STOSOWANIA

ZABIEGI DOLISTNE

Dawka: 5 L/ha w min. 100 L wody

- > ZBOŻA – Termin stosowania: Od początku strzelania w źdźbło do początków kłoszenia
- > ROŚLINY STRĄCZKOWE – Termin stosowania: od fazy 5-10 cm – początek kwitnienia – tworzenie strąków
- > ZIEMIANKI – Termin stosowania: 3-4 zabiegi od początku formowania bulw, w odstępach 14 dniowych
- > KUKURYDZA, RZEPAK, BURAKI CUKROWE - Termin stosowania: 1-2 zabiegi w okresach występowania stresów oraz później na dobrze rozwiniętych liściach
- > WARZYWA - Termin stosowania: 3-4 zabiegi, w odstępach 10 - 14 dniowych, w okresie wegetacji, szczególnie po wysadzeniu roślin
- > DRZEWA OWOCOWE - Termin stosowania: 4 zabiegi od momentu opadania płatków, w odstępach 14 dniowych
- > OWOCE JAGODOWE - Termin stosowania: 1-2 zabiegi na dobrze wykształconych liściach

ZALECENIA STOSOWANIA

W celu uzyskania optymalnego efektu należy zastosować optymalną ilość wody, która pozwoli na pokrycie całej rośliny. Należy unikać wykonywania zabiegów w czasie silnego nasłonecznienia i/lub wysokich temperatur. Jeśli to możliwe zabieg należy wykonać wieczorem lub wcześniej rano, szczególnie gdy wg prognozy pogody spodziewane są temperatury przekraczające 25°C w ciągu dnia. W przypadku roślin we wczesnym stadium rozwoju, w warunkach stresowych należy rozważyć zmniejszone dawki. Napełnić zbiornik opryskiwacza połową wymaganej ilości i włączyć mieszadło. Dobrze wstrząsnąć opakowaniem Thiomax C i dodać odpowiednią ilość nawozu do opryskiwacza. Uzupełnić zbiornik wodą do pełnej ilości, cały czas mieszając. Po zakończeniu zabiegu aparaturę dokładnie umyć.

Środki ostrożności

MIESZANIE Z INNYMI PRODUKTAMI: Z uwagi na brak możliwości przewidzenia wszystkich okoliczności, takich jak: jakość wody użytej do przygotowania cieczy użytkowej, rodzaj i ilość dodawanych środków ochrony roślin oraz formuły nowo rejestrowanych pestycydów, przy niesprawdzonych kombinacjach zaleca się wykonanie próby mieszania składników w oddzielnym pojemniku, w małej objętości roztworu i odczekanie czy nie pojawiają się niepożądane reakcje. Przy wykonywaniu mieszanki zbiornikowej produkty o formuły proszkowej powinny być dodawane w pierwszej kolejności. Zawsze należy czytać instrukcję stosowania wydaną przez producenta każdego preparatu, który ma być wykorzystany do zabiegu. Jeżeli zaistnieją jakiegokolwiek wątpliwości należy skontaktować się z producentem preparatu.

WAŻNE: Stosować zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji znajdującej się na opakowaniu. Zabiegi przeprowadzać według zasad najlepszej praktyki rolniczej, uwzględniając specyficzne warunki gospodarstwa, takie jak rodzaj gleby, warunki pogodowe, sposób uprawy oraz wymagania odmianowe. AGRONUTRITION gwarantuje wysoką jakość produktów, które pozostają w oryginalnych opakowaniach i przy zachowaniu wskazanych okresów przydatności, co gwarantuje zgodność składu z deklarowanym na opakowaniu. W celu uzyskania karty charakterystyki produktu prosimy o kontakt: fds-msds@agro-nutrition.fr