

FULVACTIV



POLEPSZACZ GLEBY

NutriCare technologies

Produkt wprowadzony do obrotu w Polsce zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu oraz w oparciu o Rozporządzenie WE 2019/515. Nawóz NK (4-4) pochodzenia roślinnego.

Skład

Całkowita zawartość kwasów fulwowych: 24%
Azot organiczny: 4%
Materia organiczna: 35%
Aminokwasy ogółem: 8%
Potas (K_2O): 4%
pH: 6

Specyfikacja

OPAKOWANIE
20 L, 1000 L

SKŁAD
Kwasy fulwowe

OKRES PRZYDATNOŚCI
24 miesiące

APLIKACJA
Doglebowa

FORMA
Płynna

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać z dala od mrozu



SPECYFIKACJA PRODUKTU

FULVACTIV poprawia żyzność gleby.

/ **WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:** stabilizuje poziom próchnicy próchnicy: koryguje stosunki wodno-powietrzne, udostępnia składniki pokarmowe i stabilizuje pH gleby.

/ **AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNA:** poprzez stymulację aktywności biologicznej i rozwoju mikroorganizmów w glebie. Stymuluje rozkład resztek pożywnych.

/ **WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE:** poprawa biodostępności składników pokarmowych dla roślin.

ZALETY STOSOWANIA

KWASY FULWOWE: FULVACTIV zawiera 24% kwasów fulwowych. Kwasy te mają szereg właściwości:

/ Poprawiają zdolność gleby do wymiany kationów (zdolność zatrzymywania i dostarczania roślinom składników odżywczych)

/ Poprawiają przyswajanie składników odżywczych dzięki zdolności zatrzymywania licznych cząstek jonowych poprawiają aktywność biologiczną gleby poprzez zwiększanie populacji bakterii i grzybów

/ Wchodzą w skład próchnicy i poprawiają strukturę gleby

/ Stymulują rozwój systemu korzeniowego w szczególności rozwój korzeni włosnikowych

AMINOKWASY: FULVACTIV zawiera 8% aminokwasów pochodzenia roślinnego. Są to przede wszystkim wyselekcjonowane aminokwasy odpowiedzialne za rozwój systemu korzeniowego, w szczególności: arginina, kwas glutaminowy, prolina, alanina i treonina.

CECHY I ZALETY FORMULACJI

Specyficzna formuła tego produktu gwarantuje bardzo wysoką przyswajalność składników odżywczych przez roztwór glebowy, zapewniając tym samym lepszą dostępność dla korzeni.

Produkt ten skomponowany jest z rygorystycznie wyselekcjonowanych surowców, gwarantowanych kontrolą jakości, aby zapewnić doskonałe bezpieczeństwo stosowania i optymalizację wchłaniania przez glebę.



SUBSTANCJE HUMINOWE:

HUMINY

Ciemny czarny

- o Zwiększa zdolność zatrzymywania wody
- o Poprawia strukturę gleby
- o Nierozpuszczalny w wodzie

KWASY HUMINOWE

Ciemny brąz

- o Rozpuszczalny w wodzie przy określonych poziomach pH (rozpuszczalny w roztworze zasadowym, nierozpuszczalny w roztworze kwasowym)
- o Ogranicza wymywanie azotanów do wód gruntowych
- o Poprawia zdolność buforową gleb
- o Rola w strukturze gleby

KWASY FULWOWE

Ciemno żółty

- o Rozpuszczalny i mobilny w wodzie przy każdym poziomie pH
- o Zdolność do zatrzymywania, kompleksowania i chelatowania elementów dla lepszego wchłaniania przez roślinę
- o Niska masa cząsteczkowa dla lepszej penetracji membrany
- o Poprawia aktywność biologiczną gleb

Sposób użycia

ZALECENIA UPRAWOWE

STOSOWANIE DOGLEBOWE

/ WARZYWA

Dawka: 3 do 8 l/ha na aplikację (co 15 dni)

/ DRZEWA OWOCOWE

Dawka: 3-8 l/ha na aplikację (co 15 dni)

/ WINOGRONA

Dawka: 3-8 l/ha na aplikację (co 15 dni)

/ UPRAWY POLOWE

Dawka: 3-8 l/ha na aplikację (co 15 dni)

STOSOWANIE DOLISTNE

/ WINOROŚL I DRZEWA OWOCOWE

Dawka: 1 do 3 L/ha - Etap: przez cały cykl

/ ZBOŻA, KUKURYDZA, RZEPAK

Dawka: 1 do 3 L/ha - Etap: przez cały cykl

/ UPRAWY PRZEMYSŁOWE: ZIEMNIAKI, BURAKI, LEN, GROCH, FASOLA

Dawka: 1 do 3 L/ha - Etap: przez cały cykl

DO ŁĄCZNEGO STOSOWANIA Z ROZTWOREM SALETRZANO-MOCZNIKOWYM

Instrukcje użytkowania

Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy użyć wystarczającej ilości wody, aby uzyskać równomierne pokrycie roślin. Unikać opryskiwania przy bardzo silnym nasłonecznieniu i/lub bardzo wysokich temperaturach. Jeśli to możliwe, stosować wieczorem lub wczesnym rankiem, zwłaszcza jeśli temperatura w ciągu dnia przekracza 28°C. Bardzo młode liście i uprawy w stresie mogą być bardziej podatne na przypalenia. W takich okolicznościach należy stosować niższe dawki.