

THERMM AGRO

WYPRODUKOWANO WE FRANCJI



NutriCare technologies

Produkt wprowadzony do obrotu w Polsce zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu oraz w oparciu o Rozporządzenie WE 2019/515.

Skład

Azot (N): 5,5% - azot mocznikowy : 5,5% (90 g/L)
Tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w kwasach mineralnych : 27% (445 g/L)
Dwutlenek krzemu (SiO_2) : 3,4% (57 g/L)
Mangan całkowity (Mn) : 0,5%
Cynk całkowity (Zn) : 1,5% (26 g/L)
Ekstrakt z Czystych Wodorostów

Specyfikacja

OPAKOWANIE

10 L

FORMULACJA

ThermoRegulator

DATA WAŻNOŚCI

18 miesięcy

APLIKACJA

Dolistna

FORMA

Płynna

GĘSTOŚĆ

1.65

WARUNKI PRZECZYSZCZANIA

Przechowywać z dala od mrozu



SPECYFIKACJA PRODUKTU

THERMM AGRO to unikalny i innowacyjny TERMOREGULATOR.

Stosowany dolistnie, THERMM AGRO ma za zadanie **ZACHOWAĆ AKTYWNOŚĆ FOTOSYNTETY I PRZEPŁYW SOKÓW KOMÓRKOWYCH**, nawet w stresujących warunkach.

ZALETY STOSOWANIA

- / Reguluje temperaturę liści dzięki filtrowi ochronnemu, który tworzy się na powierzchni liści, pomagając w utrzymaniu ogólnego metabolizmu rośliny
- / Zwiększa wiązanie węgla, a co za tym idzie, procent suchej masy, poprawiając w ten sposób plony i ochronę
- / Zapewnia jednolitość rozmiarów i zapobiega utracie kalibru w stresujących okresach
- / Poprawia transport wody, wapnia i składników pokarmowych
- / Poprawia produktywność i jakość oraz chroni przed wszelkiego rodzaju stresami (woda, wiatr, zimno lub wysoka temperatura, mróz, ...)
- / Połączenie Ca + Si tworzy na powierzchni liścia filtr ochronny, ograniczający wpływ promieni UV na ogólne nagrzewanie się rośliny
- / Aktywny kompleks reguluje otwieranie i zamykanie aparatów szparkowych w celu utrzymania aktywności fotosyntetycznej (efekt biomasy i plonu)
- / Wapń działa również wzmacniająco na ściany komórkowe: działa przeciw pękaniu
- / Ekstrakty z wodorostów: oprócz działania wspomagającego, mają właściwości antystresowe

CECHY I ZALETY FORMULACJI

TERMOREGULATOR - AKTYWNA KOMPLEKSOWA TECHNOLOGIA

1- MIKRONIZOWANY ROZTWÓR KALCYTU: mikronizacja cząstek kalcytu umożliwia pełną i szybką penetrację pierwiastków: 100% cząstek ma wielkość mniejszą niż 10 mikronów

2- ACTIV COMPLEX: mikronizowane cząstki kalcytu (CaCO_3) rozpadają się na CO_2 i Ca^{2+} w komorach porów liści.


3- EFEKT CO_2 : CO_2 z aktywowanego kalcytu aktywuje fotosyntezę

4- PENETRACJA DOLISTNA:

Ekstrakty z wodorostów poprawiają formułę dzięki alginianom (efekt adiuwantowy)

SILIKON: Właściwości zapobiegające zbrylaniu, zapewniające optymalną skuteczność asymilacji

Sposób działania



Sposób użycia

ZALECENIA UPRAWOWE

/ Zboża

Dawka 1-2 L/ha, Okres stosowania: 1 aplikacja od drugiego kolanka do rozwinięcia ostatniego liścia

/ Rzepak oleisty

Dawka: 2 L/ha – Okres stosowania: 1-2 aplikacje w fazie opadania płatków i 10-15 dni później

/ Kukurydza

Dawka: 2 L/ha - Okres stosowania: 1 aplikacja od fazy 8-10 liści.

/ Ziemniaki

Dawka: 2-3 L/ha Maksymalne stężenie: 3% Okres stosowania: 2-3 aplikacje co 15 dni począwszy od fazy BBCH42 (osiągnięte 20-30% całkowitej końcowej masy bulw)

/ Burak cukrowy

Dawka: 2 L/ha – Okres stosowania: 1-2 aplikacje od fazy zamykania rzędów i w razie potrzeby powtórzyć po 15 dniach

/ Słonecznik

Dawka: 2 L/ha – Okres stosowania: 1 aplikacja od fazy 10 liści

/ Warzywa

Salata: Dawka: 2-3 aplikacje co 15 dni w dawce 2 l/ha podczas wzrostu wegetatywnego,

Pomidory: Dawka: 2-3 L/ha, Okres stosowania: po zawiązaniu owoców,

Melon: Dawka: 2-3 L/ha od początku kwitnienia.

/ Winogrona

Dawka 1-3 L/ha: Okres stosowania: 2-3 aplikacje co 15 dni po kwitnieniu, Maksymalne stężenie: 3%

/ Drzewa owocowe

Dawka 2-3 L/ha, Okres stosowania: 2-3 aplikacje co 15 dni w dawce 1-3L/ha po zawiązaniu owoców

/ Truskawki

Dawka 2 L/ha, Okres stosowania: po zawiązaniu owoców

Instrukcje użytkowania

Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy użyć wystarczającej ilości wody, aby uzyskać równomierne pokrycie roślin. Unikać opryskiwania przy bardzo silnym nasłonecznieniu i/lub bardzo wysokich temperaturach. Jeśli to możliwe, stosować wieczorem lub wczesnym rankiem, zwłaszcza jeśli temperatura w ciągu dnia przekracza 28°C. Bardzo młode liście i uprawy w stresie mogą być bardziej podatne na przypalenia. W takich okolicznościach należy stosować niższe dawki i odpowiednie odstępy między aplikacjami.